



### Benefícios

- 👍 **Segurança e estabilidade na safrinha**
- 👍 **Tolerância aos enfezamentos**
- 👍 **Excelente sistema radicular**
- 👍 **Qualidade de grãos**
- 👍 **Flexibilidade de posicionamento**
- 👍 **Alta sanidade foliar**

### Reação a doenças

Antracnose de colmo \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cercosporiose \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Complexo mollicutes e viroses \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diplodia \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ferrugem branca \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

### Características agrônômicas

- Tecnologia recomendada **Média**
- Época de plantio **Safra/Safrinha**
- Finalidade de uso **Grãos/Silagem**
- Maturidade relativa em dias (RM) **132**
- Tipo de grão **Semiduro alaranjado**
- Empalhamento **Bom**
- Arquitetura da folha **Semiereta**

Ferrugem comum \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ferrugem polissora \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fusarium \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Helmintosporiose \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mancha-branca \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A reação à doenças pode sofrer variações em função do ambiente e de ocorrência de forte pressão do patógeno.  
Notas: 9 = alta tolerância | 1 = suscetível

### Recomendações de plantio

Verão	Regiões edafoclimáticas	Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	RS/SC/PR (Baixo)																
	RS/SC/PR (Alto)																
	MG/SP																
	GO/DF																
	BA																
	TO																
	MA/PI																
	SE**																

\*\* Época ideal de plantio de abril a junho, demais épocas sob consulta técnica.  
- Recomendações referentes ao estande final de mil plantas/ha.

Safrinha	Regiões edafoclimáticas	Janeiro				Fevereiro				Março							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	PR (Oeste)/MS (Sul)																
	PR (Alto)																
	PR (Norte)/SP (Sul)																
	GO/DF (Alto)																
	MG																
	GO (Baixo)																
	MT/RO																
	Matopiba																

NR = Não Recomendado